

Les soins vétérinaires du poulain orphelin

VACCINATION

Faire un primo-vaccin à la naissance du poulain si la mère n'est pas vaccinée dans les trois mois précédant le poulinage.

CORDON OMBILICAL

Nettoyer à la teinture d'iode la cicatrice du cordon en baignant celui-ci.
Renouvelez l'opération 2 ou 3 fois si nécessaire pour assécher le cordon.

MECONIUM

Mettre à la naissance par voie rectale un MICROLAX pour aider à l'évacuation du méconium "crottin particulièrement dur à éjecter"

Répéter l'opération si nécessaire.

Il faut éviter les bouchons dangereux pour le transit.

CONSTIPATION

Elle est courante dans les deux ou trois jours suivant la naissance.

Administrez un microlax par voie rectale ou faites un lavement par voie rectale avec une seringue d'eau tiède additionnée de savon liquide.

Symptômes : le poulain pousse, fait le dos rond et refuse de se nourrir.

FLORE INTESTINALE

Pour l'aider à se créer une bonne flore intestinale, ajouter à son lait matin et soir durant trois jours deux gélules de levure de bière.

TEMPERATURE

Celle-ci se prend par voie rectale et doit être située entre 37.2° et 38.5°. Contactez votre vétérinaire si besoin est!

PROBLEME URINAIRE

Vérifiez que votre poulain urine correctement. Il arrive parfois que la verge des mâles ne sorte pas bien.

Dans ce cas aidez le et vérifiez que l'urine ne reste pas dans le ventre ou la vessie. Quelques massages de points spécifiques soulagent ce problème. Contactez votre ostéopathe!

MYCOSE BUCCALE

Votre poulain ne boit pas et joue avec son lait! Il est peut être gêné par une mycose buccale. Vérifiez en passant votre ongle délicatement sur sa langue, si vous obtenez une matière farineuse et blanche, traitez 3 fois par jour pendant trois jours après une buvée, avec de la mycostatine en pipette.

Les poulains mis sous antibiotiques sont très souvent atteints de champignons buccaux.

DIARRHEE

Pratiquement chaque poulain va rencontrer des problèmes de diarrhées vers son huitième jour de vie, celui de l'installation de sa flore intestinale.

Avant toutes choses prenez la température pour vérifier que celle-ci ne soit pas due à une infection virale. Si le poulain a de la température, pas d'effolement même si cela reste très impressionnant.

Ajouter à son lait de l'hémodiar ou de l'antidiar jusqu'à la re-consolidation de ses selles (trois ou quatre jours)

Vous pouvez également ralentir son transit et le soulager de ses douleurs de digestion en lui administrant soit par voie rectale, en suppositoires ou en intramusculaire sous forme liquide du spafon deux fois par jour.

Attention au dosage, votre poulain pèse environ 60 à 80 kg selon son âge et sa race!

ULCERE

Si votre poulain grince des dents il souffre sûrement d'un début d'ulcère (fréquent chez les poulains qui ont reçu des antibiotiques).

Le traitement peut être préventif ou curatif.

En injection intra-musculaire 5ml de tagamet matin et soir durant trois jours.

ATTENTION ! II S'AGIT ICI D' INDICATIONS.
SI VOUS AVEZ UN DOUTE CONTACTEZ VOTRE VETERINAIRE!!